

# CESSON GRAND LARGE




# SOMMAIRE

- **Obstruction des voies aériennes,**
- **Hémorragies externes,**
- **Malaise,**
- **Plaies,**
- **Brûlures,**
- **Traumatisme,**
- **Perte de connaissance,**
- **Arrêt cardiaque.**

## Obstruction des voies aériennes

### Fausse route



## Obstruction brutale des voies aériennes

### La victime:

Ne peut plus parler, crier, tousser ou émettre un son;

Garde la bouche ouverte;

S'agite, devient bleu puis perd connaissance.



# Obstruction brutale des voies aériennes

## C.A.T



- 5 claques dans le dos,
- Le talon de la main,
- Entre les omoplates.




Talon de la main



# Obstruction brutale des voies aériennes

**C.A.T**

- 5 compressions abdominales



# Obstruction partielle des voies aériennes

## La victime:

Peut parler, crier, tousser ou émettre un son.

## **Obstruction partielle des voies aériennes**

- Pas d'intervention,
- Position où la victime se sent le mieux,
- Encourager à tousser,
- Avis médical,
- Surveiller.

**Si la toux devient inefficace et que la victime montre des signes de fatigue = obst complète**


# Obstruction des voies aériennes

## Mise en situation




## Appareil circulatoire

- battements par minute: 60 à 100
- Le cœur brasse par minute: 5l
- Volume sanguin: 7 à 8% de sa masse corporelle
- coagulation: 10 mn



**Appareil circulatoire**



# Hémorragies

Qu'est-ce qu'une hémorragie ?



Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui provient :

- d'une plaie,
- d'un orifice naturel,
- qui ne s'arrête pas spontanément.

## Hémorragies

### Quels sont les risques ?

**pour la victime :**

- détresse circulatoire
- arrêt cardiaque

**pour le sauveteur :**

- d'être infecté par une maladie transmissible (effractions cutanées ou projection sur les muqueuses, bouche, yeux).





## C.A.T

Arrêter ou limiter la perte de sang et *retarder*  
l'installation de la *détresse* pouvant entraîner la mort.


La compression des vaisseaux sanguins,  
au niveau d'une plaie arrête le saignement:



par compression directe




par pansement compressif



## Le garrot



### Garrot tourniquet improvisé



### Garrot professionnel



## Le garrot



Une fois mis en place, le garrot doit toujours rester visible et ne *jamais* être retiré sans avis médical.

# Hémorragies




## Mise en situation



# CESSON GRAND LARGE

**Malaise**



## Malaise

**Le malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, sans pouvoir identifier obligatoirement l'origine.**

**Cette sensation, parfois répétitive, peut être fugace ou durable, de survenue brutale ou progressive.**

# Malaise

**Causes :**

**Maladies**

**Intoxications**

**Allergies**

# Malaise

## Risques

**Certains signes doivent être rapidement reconnus car la prise en charge de la victime est urgente en service spécialisé pour éviter des séquelles définitives ou une évolution fatale.**

**Certains signes, apparemment sans gravité, peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale.**

# Malaise

## Principes d'action :

- Observer
  - Écouter
  - Questionner
  - Obtenir un avis médical

## Malaise



PERTE DE LA VISION  
OU  
ANISOCORIE



# Malaise

## Écouter



## Malaise



## Questionner



## Malaise

**SCA :** douleur dans la poitrine

(syndrome coronarien aigu)

**AVC :** (accident vasculaire cérébral)

- faiblesse ou paralysie d'un bras ;
- déformation de la face ;
- perte de la vision d'un œil ou les deux ;
- difficulté de langage (cohérence de la parole) ou de compréhension ;
- mal de tête sévère, inhabituel ;
- perte d'équilibre, instabilité de marche ou chute inexplicée.

**Maladie infectieuse/contagieuse :**

- fièvre, frissons, sueurs abondantes, courbatures, fatigue intense
- douleurs abdominales intenses et troubles digestives,
- difficulté à respirer ou à parler, froid, pâleur intense.

**Prise en charge urgente = alerte immédiate**

## Malaise

**Vagaux** : étourdissement, nausées, sueurs, chaleur, pt noirs vision,

sensation de perte de conscience.


Exercices : accroupissement et croisement  
jambes ,crochetage  
des doigts et tension des muscles.

**Chaleur** : été, exposition, effort.

Mettre la victime au frais et aéré.  
Prendre la température.

# Malaise

## Cas particuliers



## Malaise

Cas particuliers



Crise de panique

# Malaise



# Brûlures




# Brûlures

**La brûlure est une lésion :  
de la peau ,  
des voies aériennes,  
ou digestives.**

## Brûlure simple

Rougeurs de la peau chez l'adulte ou d'une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.



## Brûlure grave

Une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime.

Une destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois indolore) souvent associée à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue.



Une brûlure dont la localisation est le visage ou le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels.

Une rougeur étendue (coup de soleil généralisé par exemple) de la peau chez l'enfant.

Une brûlure d'origine chimique, électrique ou radiologique.


**Aucun produit ne doit être appliqué sur une brûlure grave sans avis médical.**

# Brûlure grave




# Brûlures


## Causes



# Brûlure



## Risques



# Brûlure



# Brûlure

